

Beleegyez nyilatkozat
Gyomortükrözés (gasztroszκόpia)

Név:	#!NEV; (sz.n.: #!BLEANYKORINEV;)	Sorszám:	#!OSZTVZSGEVES;
Születési hely, id :	#!BSZULHELY; #!SZULIDO; (#!BELETKORA; éves)	TAJ:	#!TAJ_TAGOLT;
Anyja neve:	#!BANYJANEVE;	Vizsgálat ideje:	#!OSZTVZSGFELV;
Lakcím:	#!BIRSZAM; #!BVAROS; #!BUTCA;		

A tápcsatorna fels szakaszának tükrözése (röviden gasztroszκόpia) a jelenleg ismert legkorszer bb módszer a nyel cs , gyomor és a nyombél betegségeinek (pl. gyulladás, fekély, daganat) a kórismezéséhez.

A vizsgálat el tti teend k

Kérjük, a vizsgálat el tt tájékoztassa orvosát arról, hogy tud-e gyógyszer iránti túlérzékenységr l (allergia), vérzékenységr l, szed-e véralvadásgátló gyógyszert, van-e epilepsziája, zöldhályogja (glaukóma), szívritmus szabályozója (pacemaker), fennáll-e terhesség. A vizsgálat (kivéve életveszélyes állapotot) éhgyomorra történik (a vizsgálat el tti napon estig szabad csak étkezni). Ha esetleg m fogsort visel, azt még a vizsgálat el tt vegye ki és helyezze biztonságos helyre.

A vizsgálat menete

A vizsgálat el tt a kórházban fekv beteg kaphat nyugtató, fájdalomcsillapító injekciót. Járóbeteg csak akkor részesülhet bódításban, ha tud a vizsgálat után 2 - 4 órás megfigyelésen a kórházban maradni, továbbá ha a beteg hazaszállítását a hozzátartozója gépkocsival vállalja. Minden beteg esetén (kivéve, ha Lidocainra allergiás) a garat helyi érzéstelenítést végzik el el ször Lidocain spray-vel. Ezt követ en egy hajlékony, ujjnyi vastag m szert (endoszkópot) vezetnek be szájon keresztül a nyel cs be, a gyomorba majd a nyombélbe. A vizsgálat során a vizsgáló az endoszkópon keresztül szövettani mintavételt végezhet a betegség tisztázására, lehet ség van daganat eltávolítására, vérzés megállítására, idegentest eltávolítására stb.

Lehetséges szöv dmények

A gyomortükrözés (mint minden orvosi beavatkozás) járhat szöv dménnyel, ez azonban nagyon ritka: el fordulhat az érzéstelenít vagy a nyugtatószer iránti túlérzékenység (allergia), szövetmintavétel vagy daganat eltávolítás során vérzés, esetleg bélátfúródás. Minden 10.000 vizsgálat közül átlagosan egy esetben sürg s m tétet kell végezni.

A gasztroszκόpia elmaradása sok esetben a beteg állapotromlásához vezet, a kezel orvos a kockázat / haszon gondos mérlegelése alapján javasolja az elvégzését.

A vizsgálat utáni teend k

A vizsgálat után fél óráig nem szabad étkezni. Ha nyugtató injekciót kapott, a vizsgálat után megfigyelésre a kórházban kell maradnia, a vizsgálat napján gépkocsit nem vezethet, veszélyes helyen nem tartózkodhat. Amennyiben hányás, hasi vagy mellkasi fájdalom, fekete székürítés el fordulna, soron kívül jelezze orvosának!

Ha bármilyen kérdése van, tegye föl a kezel orvosának vagy az gasztroszκόpiát végz orvosnak.

Nyilatkozat

Beleegyzem, hogy a beavatkozás menetér l fénykép, vagy videofelvételek készüljenek azzal a kikötéssel, hogy azokon személyem nem válik felismerhet vé.

Tudomásom van arról, hogy a gyógyintézetben egészségügyi személyzet képzése is folyik, és ezért beleegyzem abba, hogy kezelésemben – felel s személy jelenlétében és annak felügyelete mellett – nemcsak orvosok, hanem orvostanhallgatók, és más egészségügyi szakdolgozók is részt vehessenek, akiket szintén az orvosi titoktartás kötelez.

A kapott tájékoztatást elegend nek és megfelel nek találtam.

A fenti tájékoztatót megértettem, kérem, hogy a vizsgálatot végezzék el rajtam.

Sopron,

.....
beteg aláírása

A beteget a vizsgálat el nyeir l, kockázatáról, az esetleges szöv dményeir l felvilágosítottam:

.....
kezel orvos

.....
endoszkópos orvos

.....
endoszkópos asszisztens

Amennyiben a részletes orvosi felvilágosítás ellenére a beavatkozást elutasítom, annak következményeiért a felelősséget átvállalom, azokat az orvosokat, akiketől a javasolt orvosi beavatkozást nem fogadtam el, a felelősség alól felmentem. Ebből eredően velük, illetve az intézménnyel szemben semminemű igényt nem támasztok.

Sopron,

.....

beteg aláírása